

ВОЗМОЖНЫЙ АЛГОРИТМ ДОЗИРОВАНИЯ ПРЕПАРАТА АПРОВАСК®

УВЕЛИЧЕНИЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО ЭФФЕКТА

УВЕЛИЧЕНИЕ
ОРГАНОПРОТЕКТИВНОГО ЭФФЕКТА


ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С УМЕРЕННЫМ
СС-РИСКОМ*

СТАРТ ПРИЕМА
ПРЕПАРАТА

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
С ВЫСОКИМ
СС-РИСКОМ*



ВСЯ СХЕМА



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АПРОВАСК®

Регистрационный номер: ЛП-002695. **Группировочное название:** амлодипин + ирбесартан. **Фармакотерапевтическая группа:** комбинированное гипотензивное средство (блокатор «медленных» кальциевых каналов + ангиотензина II рецепторов антагонист). **Код АТХ:** C09DB05. **Показания к применению:** артериальная гипертензия (при неэффективности монотерапии ирбесартаном или амлодипином). **Противопоказания:** повышенная чувствительность к ирбесартану, амлодипину и другим производным дигидропиридина или к вспомогательным веществам препарата. Кардиогенный шок. Клинически значимый аортальный стеноз. Нестабильная стенокардия (за исключением стенокардии Принцметала). Беременность. Период грудного вскармливания. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Одновременное применение с лекарственными препаратами, содержащими алискирен, у пациентов с сахарным диабетом или с умеренно выраженной и тяжелой почечной недостаточностью (СКФ < 60 мл/мин/1,73 м²). Одновременное применение с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) у пациентов с диабетической нефропатией. **С осторожностью:** у пациентов с гиповолемией и гипонатриемией, на гемодиализе, при соблюдении диеты с ограничением потребления поваренной соли, диарее, рвоте; у пациентов, функция почек которых зависит от активности РААС; у пациентов с хронической сердечной недостаточностью II–IV функционального класса по классификации NYHA неишемической этиологии; у пациентов с печеночной недостаточностью; у пациентов с почечной недостаточностью и после трансплантации почки; у пациентов со стенозом аортального и митрального клапанов или гипертрофической обструктивной кардиомиопатией; у пациентов с ишемической болезнью сердца и/или клинически значимым атеросклерозом сосудов головного мозга; у пациентов с синдромом слабости синусового узла. **Способ применения и дозы:** внутрь, запивая водой, независимо от приема пищи. Начальная и поддерживающая доза — 1 таблетка в сутки. Максимальная рекомендованная доза — 150 мг/10 мг или 300 мг/10 мг в сутки. **Побочные действия** (см. полную инструкцию по применению; приведены частые, очень частые и способные причинить серьезный ущерб здоровью побочные эффекты): периферические отеки, отеки, ощущение сердцебиения, головокружение, головная боль, сонливость, ортостатическая гипотензия, чрезмерное снижение АД, ангионевротический отек, инфаркт миокарда, отечность десен, протеинурия, вертиго, тошнота/рвота, нарушения ритма сердца, боли в верхней части живота, нарушения со стороны языка, включая дисгевзию, глоссодиния, повышенная утомляемость, «приливы» крови к коже с чувством жара, покраснение кожных покровов, кашель, контактный дерматит. **Форма выпуска:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 150 мг, 10 мг + 150 мг, 5 мг + 300 мг и 10 мг + 300 мг. **Условия хранения:** хранить при температуре не выше 30 °С. **Срок годности:** 3 года. **Условия отпуска:** отпускается по рецепту.

* СС-риск — Сердечно-сосудистый риск.

Инструкция по медицинскому применению препарата Апроваск®. Регистрационный номер: ЛП-002695. Дата последнего изменения инструкции: 13.05.2019. Кобалава Ж.Д., Конради А.О. и соавт. Клинические рекомендации. Артериальная гипертензия у взрослых. РКО. 2020. [Эл. ресурс]: <http://cr.rosminzdrav.ru/#!/schema/687>. Дата последнего доступа: 19.10.2020

Информация предназначена для специалистов здравоохранения.

Представительство АО «Санофи-авентис груп» (Франция)

125009, Москва, ул. Тверская, д. 22. Тел.: (495) 721-14-11, факс: (495) 721-14-11, www.sanofi. MAT-RU-2002654 – 10/2020